
MIXTE · NOUVELLE-ZÉLANDE

Sticklebract

CODE IHGC SBR

Sticklebract est une variété néo-zélandaise à usage mixte, ainsi qu'une variété créée pour endiguer les problèmes de Black Root Rot qui étaient présents dans le pays au milieu du 20e siècle. Il a été sélectionné comme semis dans les années 1970 parmi le premier choix à pollinisation ouverte.

Profil aromatique



Familles d'arômes citées, sans intensité publiée.

Chimie

Acides alpha	13 à 14,2 %
Acides bêta	7,5 à 8,5 %
Cohumulone	40 à 45 %
Huiles totales (ml/100 g)	0,76 à 1,71 ml/100 g
Myrcène	51 à 64 %
Humulène	8 à 11 %
Caryophyllène	3 à 6 %
Farnésène	4 à 4,6 %

Barres : plage publiée, de 0 au maximum observé dans le répertoire.

Au champ

Maturité	Mi-mars (hémisphère sud) à début avril (hémisphère sud)
Rendement	1 900 à 2 560 kg/ha
Vigueur	Forte
Taille du cône	Moyen à grand
Densité du cône	Modérée
Facilité de récolte	Difficile
Conservation	Conserve 60 à 70 % de ses acides alpha après 6 mois à 20 °C

En brasserie

Styles de bière	ESB (extra special bitter)
Saveurs	Arôme de pin et citron
Substituts	Northern Brewer (GR)
Variétés proches	Waimea, Southern Cross, Galena, Atlas, Idaho Gem™