
AMÉRISANT · ÉTATS-UNIS

Yakima Cluster

CODE IHGC CLU

Cultivé pour la première fois à la fin des années 50, Yakima Cluster est la fille de Late Cluster et la petite-fille de Pacific Coast Cluster.

Profil aromatique



Familles d'arômes citées, sans intensité publiée.

Chimie

Acides alpha	4,4 à 9,8 %
Acides bêta	3 à 6,1 %
Cohumulone	42 %
Huiles totales (ml/100 g)	0,24 à 0,9 ml/100 g
Myrcène	45 à 55 %
Humulène	18 %
Caryophyllène	6 à 7 %
Farnésène	< 1 %

Barres : plage publiée, de 0 au maximum observé dans le répertoire.

Au champ

Maturité	Mi-août à début septembre
Rendement	2 020 à 2 250 kg/ha
Vigueur	Forte
Sensible à	Mildiou
Conservation	Conserve 85 % de ses acides alpha après 6 mois à 20 °C

En brasserie

Substituts	Chinook
Variétés proches	Southern Brewer, Neoplanta, Density, Cluster (USA), Golden Star

Fiche en ligne, avec ses sources : **listehoublon.fr/les-houblons/yakima-cluster/**

Plants de houblon : hopstock.fr · Houblon récolté en France : brewstock.fr